

ATELIER DEBAT

Gestion de la bithérapie antiagrégante plaquettaire après revascularisation coronaire du patient à Haut Risque Hémorragique

2021 © 27^{ème} Congrès du CNCH, Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.

2021 © 27^{ème} Congrès du CNCH, Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.



2021 © 27^{ème} Congrès du CNCH, Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.

2021 © 27^{ème} Congrès du CNCH, Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.

Définition du patient à Haut Risque Hémorragique

B. Lattuca

MASTER DAPT, le design de l'étude

JP. Collet

Cas clinique 1: Angioplastie programmée chez un patient en FA permanente sous anticoagulants

Ce qu'a fait le Junior

A. Darmon

Ce que recommande le Sénior

G. Gibault-Genty

Que dit MASTER DAPT ?

JP. Collet

Cas clinique 2: Un SCA chez un patient à très Haut Risque Ischémique et Hémorragique

Ce qu'a fait le Junior

T. Levesque

Ce que recommande le Sénior

G. Rangé

Que dit MASTER DAPT ?

JP. Collet

Que doit-on retenir ?

J. Monségu